

## TROTA FARIO



**Specie ittica:** Alloctona  
**Nome scientifico:** Salmo trutta

La Trota fario presenta un corpo affusolato ed allungato, la bocca grande, le scaglie piccole. Come tutti gli appartenenti alla famiglia dei Salmonidi, ha una seconda piccola pinna dorsale situata posteriormente alla prima e caratterizzata dal non avere raggi ossei di sostegno (pinna adiposa). La colorazione e le dimensioni possono essere variabili, anche in relazione all'ambiente in cui vive: in genere presenta dorso scuro e fianchi argentei, con un numero variabile di macchie rosse e macchie nere sparse per il corpo. Le pinne ventrali, le pettorali e l'anale sono giallastre, la caudale è più scura lungo il margine.

Si riproduce da ottobre a gennaio, in acque poco profonde e a fondo ghiaioso. La piena maturità sessuale viene di solito raggiunta a 2-3 anni nei maschi e a 3-4 anni nelle femmine. L' accrescimento è in genere veloce e alla fine del primo anno di vita le giovani Trote possono già raggiungere i 15 cm di lunghezza, per misurarne 20 alla fine del secondo. Nei torrenti la Fario non supera di solito i 40 cm di lunghezza, nei laghi e nei fiumi più ampi può raggiungere fino a 10 Kg di peso.

Si ciba soprattutto di insetti e crostacei; quando raggiunge le maggiori dimensioni si alimenta prevalentemente di pesci.

E' la tipica abitatrice del tratto montano dei corsi d'acqua europei, ma vive anche nei laghi con acque fredde e ricche di ossigeno.

Durante il periodo riproduttivo la Fario risale i corsi d'acqua alla ricerca di aree di frega idonee; le uova vengono deposte in piccole buche scavate dalle femmine con la coda sul fondo dei corsi d'acqua.